

## 食道がん

レジメン名	FP 療法	投与間隔					28 日間
投与薬剤		1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	
フルオロウラシル	持続	800mg/m <sup>2</sup> /日					
シスプラチン		80mg/m <sup>2</sup>					
ホスアプレピタント		150mg					
パロノセトロン		0.75mg					
デキサメタゾン		9.9mg					
デキサメタゾン	内服		8mg	8mg	8mg		

レジメン名	Weekly PTX 療法			投与間隔			49 日間
投与薬剤	1 日目	8 日目	15 日目	22 日目	29 日目	36 日目	
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	
クロルフェニラミン	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	
デキサメタゾン	6.6mg	6.6mg	6.6mg	6.6mg	6.6mg	6.6mg	
ファモチジン	20mg	20mg	20mg	20mg	20mg	20mg	

レジメン名	ニボルマブ療法	投与間隔	14 日間または 28 日間
投与薬剤	1 日目		
ニボルマブ	240mg (28 日毎の場合は 480mg)		